

Fläche Anwendung	Kleine Flächen (bis ca. 2 m²)	Große Flächen
Prophylaxe	A ☐ FRANKEN SG Flächendesinfektion gebrauchsfertige Lösung -> Einwirkzeit 1 Min. (Gutachten) / 5 Min. (VAH) ☐ FrankoDes gebrauchsfertige alkoholische Lösung -> Einwirkzeit 1 Min. (Gutachten) / 5 Min. (VAH)** ☐ Franko-Fix Plus feuchte Einmal-Desinfektionstücher -> Einwirkzeit 5 Min. ☐ Franko-Fix Ultra feuchte Einmal-Desinfektionstücher -> Einwirkzeit 1 Min. (Noroviren 30 Min.) ☐ _____	B ☐ FRANKO-CID Plus 1,0 %-ige Lösung $\triangleq$ 2 Dosierkappen = 40 ml auf 4 l Wasser -> Einwirkzeit 30 Min. ☐ FRANKEN SG Flächendesinfektion gebrauchsfertige Lösung -> Einwirkzeit 1 Min. (Gutachten) / 5 Min. (VAH) ☐ _____
im Ausbruchsfall	C ☐ Franko-Nol viruzid gebrauchsfertige alkoholische Lösung -> Einwirkzeit 1 Min. (DGHM) / 5 Min. (VAH)* ☐ Spray Off Wipes viruzid feuchte Einmal-Desinfektionstücher -> Einwirkzeit 5 Min. ☐ _____	D ☐ Dismozon® plus 1,6 %-ige Lösung $\triangleq$ 1 Beutel auf 1 l Wasser -> Einwirkzeit 15 Min. (VAH) ☐ 3,6 %-ige Lösung $\triangleq$ 1 Beutel auf 444 ml Wasser -> Einwirkzeit 4 Std. (RKI) ☐ _____

Hier können Sie die Produkte markieren, welche in Ihrer Einrichtung verwendet werden.

Hinweise: Alle Desinfektionsmittel sind geprüft und anerkannt vom VAH (Verbund für Angewandte Hygiene e.V.) und wirksam gegen COVID-19-Viren.

Eine Desinfektion sollte im Bedarfsfall und generell bei Verdacht auf infektiöse Erkrankungen durchgeführt werden (Meningitis, wiederholter Durchfall etc.), um eine Ausbreitung zu vermeiden. Bei meldepflichtigen Erkrankungen ist das örtliche Gesundheitsamt zu informieren. Ein Desinfektionserfolg ist nur dort gegeben, wo ein Feuchtigkeitsfilm nachgewiesen werden kann: Bitte unbedingt die Einwirkzeiten einhalten. Schutzhandschuhe: Zum Schutz vor Kontamination mit möglicherweise infektiösen Substanzen wie Blut, Stuhl, Urin, Sekreten.

Zusätzliche Hinweise können Sie dem BGR 250/TRGA 250 (Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege) entnehmen. (www.bgw-online.de/internet/preview?id=914)

* Rotavirus gem. EN 14476 -> 5 Min.; Norovirus gem. EN 14476 -> 1 Min. Einwirkzeit.

** Rotavirus -> 30 Sek.; Norovirus -> 5 Min. Einwirkzeit.

Haben Sie noch Fragen? Unsere Außendienstmitarbeiter beraten Sie gern.